Traumatisierung durch sexuelle Gewalt im Kindesalter

Fachtagung AK gegen sexuellen Missbrauch, 01.06.17, Schwandorf

„Aufdeckungsarbeit“
bis Ende der 1990er Jahre

TRAUMA-URSACHEN

Schocktraumatisierung

URSACHE		einmalige (Monotraumata)	anhaltende (chronisch, mehrfach, komplex)
<u>Natur-Katastrophen</u>		z.B. Erdbeben, Überschwemmung	Daraus resultierender Heimatverlust und Verarmung
<u>Man-made Disaster</u>	Identifikationsferne Täter	z.B. ein Überfall durch fremde Soldaten	z.B. daraus resultierende Vertreibung
	<u>Identifikationsfigur</u>	Bedrohung bzw. Übergriff durch vertraute Menschen, durch Familienangehörige, durch Mutter oder Vater	Misshandlung, Missbrauch oder seelische Grausamkeit im sozialen Nahfeld, ... in der Familie, durch Mutter oder Vater

Beziehungstraumatisierung

WER SIND DIE TÄTER?

- **Sexualstraftäter** haben im strafrechtlichen Sinne gegen entsprechende Gesetzesnormen verstoßen. Vor der rechtskräftigen Verurteilung spricht man von **Be-** bzw. **Angeschuldigten**
- Nach Angaben der Bundesregierung sind Sexualtäter zu **93 %** dem Kind bekannt, zu **zwei Drittel** gehören sie der Familie oder deren nahem Umfeld an.

WER SIND DIE TÄTER?

- **Regressiver Typ (ca. 90%):**
  - sexuelle Orientierung auf Erwachsene gerichtet, aber durch Kinder sexuell erregbar
  - „Ersatzobjekt-Täter“ (leichtere Verfügbarkeit von Kindern, Probleme mit erwachsenen Sexualpartnern...)

- **Fixierter Typ (ca. 1 – 10%):**
  - primäre sexuelle Orientierung auf Kinder
  - durch Erwachsene nicht oder kaum sexuell erregbar
  - klassische „Pädophilie“

- **Soziopathischer Typ (sehr selten):**
  - mangelnde Empathie für Opfer
  - Mitunter sadistische Neigungen aus
  - Sexualität dient nicht primär zur sexuellen Befriedigung, sondern als Mittel zur Unterdrückung
  - „sadistischer“ Typ

WER SIND DIE TÄTER?

Typisierung für täter-therapeutische Behandlungsansätze:

- sozial und psychisch unauffällige Täter
- psychopathologisch hoch auffällige Täter
- überangepasste Täter
- intelligenzgeminderte Täter
- dissoziale Täter

BEGRIFFLICHKEITEN

- einmalige sexuelle Traumatisierung (meist Fremdtäter)
- fortgesetzte, sequentielle, chronische oder kumulative sexuelle Traumatisierung
- komplexe Traumatisierung
- Frühtraumatisierung
- Beziehungstraumatisierung
- Entwicklungstraumatisierung
- „traumatische“ Bindung
- sekundäre Traumatisierung

TRAUMA-KREISLAUF

TÄUSCHUNG

als vierte Stressreaktion

(die „überzeugende Fassade“)

Das **Bindungsbedürfnis** eines Kindes steht hierarchisch **vor** dem **Bedürfnis nach körperlicher Integrität** und **organismischer Aktualisierung**.

Missbrauchserleben im sozialen Nahraum aktiviert chronisch **gleichzeitig** das Bindungs- und das Verteidigungssystem des Kindes.

Im **Kompromiss des Täuschungsverhaltens** schickt sich das Kind in das Unvermeidliche, verbindet Nachgeben und Aktivität und sichert so sein physisches und psychisches Überleben.

INZEST = BEZIEHUNGSTRAUMATISIERUNG

Nahe Bezugspersonen, die eigentlich zuständig sind für den Schutz, die Fürsorge und die Pflege ihres Kindes verletzen durch ihre sexuellen Grenzüberschreitungen Generationen-, körperliche und seelische Grenzen des Kindes - mit langfristigen Folgen für dessen physische, psychische und oft auch kognitive Entwicklung.

SYMPTOME VON BEZIEHUNGSTRAUMATISIERUNG

Aus der Diskrepanz zwischen einer tiefen Sehnsucht nach Bindung und der durch Bindungstraumatisierung chronifizierten Angst vor Nähe entwickeln diese Kinder eine **Unfähigkeit, Gefühle und Körperempfindungen wahrzunehmen und zuzuordnen** sowie vielfältige Symptome (= Notsignale der Seele) auf körperlicher, psychischer, kognitiver und Verhaltensebene.

SYMPTOME VON BEZIEHUNGSTRAUMATISIERUNG

„Lärmende“ Symptomatik:

Aggressions- und Impuls-durchbrüche, pseudoautonome Strategien, Stehlen, Lügen, Dissozialität, Grenzüberschreitungen, Weglaufen, Streunen, Prostitution, Selbstverletzungen, Reinszenierungen

Bizarre Symptomatik:

Dissoziative Symptome, Depersonalisation, Erstarrung, Lähmung, Wiedererleben/ Flashbacks, Essenhorten und –verstecken, Einkoten, Rollenumkehr in Beziehungen mit Erwachsenen

„Stille“ Symptomatik:

defensives Verhalten, emotionale, körperliche und verhaltensmäßige Vermeidung, Abstumpfung, sozialer Rückzug, dissoziative Phänomene, Konzentrationsstörungen, Anstrengungs-verweigerung, heimliche Selbstverletzung, Hyperanpassung, Klammern, Misstrauen

SEXUELLE TRAUMATISIERUNG - FOLGEN

- sexueller Missbrauch führt in der Regel über Amnesie und Abwehr zu **Störungen in der Beziehungsgestaltung**
- die einzigen spezifischen Symptome sind „**sexualisiertes**“ **Verhalten** und **Abwehr von Sexualität**, wobei auch hier nicht von der Beobachtung dieser Phänomene kausal auf tatsächlich erlebten sexuellen Missbrauch geschlossen werden kann
- Betroffene leben im **Spannungsfeld** zwischen ihrem immensen Bedürfnis nach Nähe und ihrer gleichzeitig immensen Angst vor Nähe
- die Nähewünsche sind **gekoppelt mit Gewalt** und **Suggestierung einer Eigenbeteiligung** („Da hast du doch auch ein schönes Gefühl, gell?“)

KENNZEICHEN VON BEZIEHUNGSTRAUMATISIERUNG

- negative Selbstwahrnehmung
- **Misstrauen und Argwohn generell u. speziell gegenüber Bezugspersonen**
- Verlust des Vertrauens darauf, von anderen geschützt zu werden
- **Unsicherheit bzgl. der Vorhersagbarkeit der Welt**
- Mentalisierungs- u. Empathie-Schwierigkeiten (Nicht-Hineinversetzen-Können in die emotionalen Zustände und die Perspektive eines anderen)
- **Schwierigkeiten, sich Verbündete zu machen**
- Verlust des Vertrauens in möglichen Schutz durch soziale und juristische Institutionen
- **zwangsläufige künftige Viktimisierung**
- Abwertung der eigenen Person, Entschuldung bis Idealisierung der schädigenden Bezugsperson(en)
- massive, überdauernde Scham- und Schuldgefühle

SEXUELLE TRAUMATISIERUNG

Wenn Kinder regelmäßig mit **erwachsener Sexualität** konfrontiert werden, fixiert sich ihre Phantasietätigkeit sehr stark auf diesen Bereich und bekommt eine hohe affektiv-erregte Wertigkeit.

Folgen:

eine **verminderte Aufmerksamkeit** und **Offenheit** für

- nicht-sexuelles Spiel
- Bewegung
- Explorieren
- Lernen

SEXUELLE TRAUMATISIERUNG

Genitale Stimulierung kann erregend sein oder beruhigen, „hilft“ also bei

- der **Ausbalancierung** von Gefühlen der Trostlosigkeit und der Verlassenheit
- und
- der **Regulierung** affektiver Anspannung und nicht-sexueller Erregungszustände

und ist gerade deshalb eine Möglichkeit, den seelischen Innenraum deprivierter Kinder gezielt in Richtung **Spüren, Füllung** oder **Entspannung** zu manipulieren.

SEXUELLE TRAUMATISIERUNG – WAS TUN?

Im **Vorfeld** von Beratung und Therapie:

- entscheidend für den Heilungsverlauf ist, wie nach Bekannt-Werden des sexuellen Missbrauchs damit umgegangen wird (Gefahr der **Retraumatisierung**)
- im **Strafverfahren** kann das subjektive Leid des Opfers nie entsprechend gewürdigt werden (außer durch ein umfassendes Geständnis)
- **Positiv-Negativ-Liste** bei Verdachtsunklarheit: *„Kann ich mir meine Gefühle, Gedanken und Impulse im Umgang mit dem Kind/Jugendlichen (=Gegenübertragung) durch etwas anderes als sexuelles Missbrauchserleben erklären?“*
- Ruhe bewahren, nicht ins Agieren kommen, fachliche Supervision einholen
- „Safety first“: vor allem Handeln steht die Gewährleistung der Sicherheit des Kindes und das Abwägen der Langzeitfolgen einer Intervention

BERATUNG UND THERAPIE

Warum kann sexuelles Missbrauchserleben „schwer in Worte kommen“?

- Loyalitätskonflikte mit den Bezugspersonen
- explizite Schweigegebote
- Gedächtnisdefizite (infantile Amnesie, Dissoziation als Überlebensstrategie)

WAS KANN ICH TUN?

Zentrale Schwerpunkte:

- Stärkung der realen und gefühlten Sicherheit bei den Kindern
- Stärkung der Affektregulation und der Impulskontrolle
- Stärkung der Selbstwirksamkeit
- gute Körpererfahrungen
- Ausgleich von vorhandenen Entwicklungsdefiziten
- Zuführung zur Traumatherapie, wenn möglich

STÄRKUNG DER SICHERHEIT

Hier geht es um die **Wahrnehmung und Überprüfung der Kontakte** des Kindes in seinem sozialen Umfeld und – gegebenenfalls – um die **Wiederherstellung** gefühlt **sicherer und planbarer Lebensbedingungen** mit klaren Abläufen und Regeln im Lebensalltag des Kindes.

STÄRKUNG VON AFFEKTREGULATION UND IMPULSKONTROLLE

Ziel ist v.a., weder sich noch andere zu verletzen

- **Benennung der aktuellen Befindlichkeit**
(„Ich sehe/spüre, du bist jetzt gerade sehr wütend/ traurig/ verzweifelt...“ bedroht!“)
- **klare, beruhigende Orientierung in der Gegenwart in Sprache, Gestik und Mimik**
(„Wir sind jetzt hier in ....., es ist heute..... Die Angst/ Wut/Trauer... gehört in den alten Film. Jetzt bist du in Sicherheit.“ – *begleitet von freundlicher Mimik und beruhigender Gestik*)
- **Herausfinden auslösender Trigger für (auto-) destruktives Verhalten**
(Was ging dem Verhalten unmittelbar voraus?)
- **deutlich abgesprochene und eingehaltene Konsequenzen auf destruktives Verhalten**
(„Was ich kaputt mache, repariere ich auch wieder.“)

STÄRKUNG DER SELBSTWIRKSAMKEIT

Wichtig sind Ressourcen, Beschäftigungen und Hobbys, die eher wenig Interaktion mit anderen Menschen erfordern und gleichzeitig Spaß und Erfolg bewirken:

- Sport
- **Naturerfahrungen**
- Musik hören, spielen (z.B. Trommeln), singen
- **Lesen, Geschichten auf CDs**
- ausgewählte u. zeitlich beschränkte Computerspiele

mit anderen:

- einfache Gruppenaktivitäten und Spiele mit klaren Regeln
- Spiele, die Rollenspiel und Phantasie fördern
- keine Konkurrenz- und Kampfspiele!

GUTE KÖRPERERFAHRUNGEN

Entspannungserfahrungen gegen chronische Übererregung:

- Schaukeln
- Entspannung im Wasser
- Massagen (Achten auf die Körpergrenzen!)
- Vielfältige, taktile und kinästetische Erfahrungen („Bohnenbad“, Sinnespfad, Fühlspiele...)
- sinnliche Erfahrung der Körpergrenzen (Körperumrandungen malen, Abstandsübungen, Höhlenbau)

AUSGLEICH VORHANDENER ENTWICKLUNGSDEFIZITE

Förderung der Körperintegration (Synchronisation, Koordination, Gefühl für Abfolge und Rhythmus, Musik und Körper):

- Geschicklichkeitsübungen (z.B. Akrobatik)
- Wahrnehmungsübungen (Verbesserung der Differenzierungsfähigkeit)
- Über-Kreuz-Übungen
- Ergotherapie
- Logotherapie
- Physiotherapie
- Theraplay
- (therapeutisches) Reiten
- Tanzen
- Laufen

PSYCHOTHERAPIE

BEI KOMPLEXER TRAUMATISIERUNG

- **traumakompetentes Verstehen** der Symptomatik, der Verhaltensphänomene und der neuronalen Verarbeitungsprozesse
- **Entwicklungsorientierung** und **Nach-Nahrung** entlang früher, zentraler Grundbedürfnisse (Geborgenheit, Verlässlichkeit und gegenseitiger Respekt)
- phasenorientierte Traumaverarbeitung (Stabilisierung, Traumafokussierung, Integration)
- eine gute Mischung aus **Beziehungsorientierung**, **Strukturgebung** und grundsätzlicher **Flexibilität**
- ein Repertoire an **schulen-, verfahrens- und methodenübergreifenden** therapeutischen Kompetenzen
- traumaspezifische Psychoedukation der Bezugspersonen
- lösungsorientierte Vernetzung aller Teile des Helfersystems

TRAUMASENSIBLES HANDELN

Psychoedukation

- Erklärung der Symptomssprache (als schlüssige Antwort auf Bedrohung)
- Erklärung des Prozessverlaufs von Traumatisierung
- Aufklärung über den geplanten Beratungs- bzw. Therapieablaufs

... sowohl bei den Betroffenen selbst als auch bei den Bezugspersonen

TRAUMASENSIBLES HANDELN

Suche nach Fakten und Zeugen

- Beschaffen von Jugendamts- und Gerichtsakten
- (vorwurfsfreie) Gespräche auch mit getrennt lebenden und/oder nicht sorgeberechtigten Elternteilen
- Biografie-Arbeit (Fotos, Lebensbuch...)
- „Trigger“-Suche“

WAS KANN ICH TUN?

Bei Dissoziation:

- Kontakt wiederherstellen („Schau mich an...“)
- dicht rangehen, laute, klare Stimme, kurze Sätze
- den eigenen Körper abgreifen lassen („Du bist ganz heil...“)
- jetzt nicht an das Trauma gehen wegen zusätzlicher Überflutung

WAS KANN ICH TUN?

- Orientierung in Raum und Zeit geben („Du bist hier in.... Heute ist Mi, der..... Wir sind gerade...“)
- deutliche Sinnesreize setzen (Geschmack, Geruch, Tastsinn...)
- Erdung: mit den Füßen auf den Boden stampfen führt auf eine reifere Entwicklungsebene zurück
- Möglichkeit der körperlichen Abreaktion schaffen (Kartons zertrampeln lassen, Dosen zerquetschen, in Kissen hauen, Boxsack)
- auch Späße machen kann die Auflösung der Dissoziation voranbringen

WAS KANN ICH TUN?

Allgemein:

- das Trauma, falls es bekannt ist, zumindest einmal unspezifisch ansprechen, um nicht dem Sog der Tabuisierung zu unterliegen („Ich weiß von..., dir ist etwas Schlimmes passiert..., du bist...“)

WAS KANN ICH TUN?

- mit **Rückschlägen in der Behandlung und Betreuung** rechnen (*Veränderung erfolgt immer über den Zwischenschritt der Irritation, in dem alte Muster verabschiedet und neue integriert werden müssen*)
- **Trauma-verarbeitende Gefühle** (wie Trauer, Wut, Angst, aber auch Stolz, Freude etc.) in verdaubaren Portionen fördern
- **nicht zu schnell** zu viel Gefühls-Verbalisierung (Gefahr von Überschwemmung und Abwehr)

WAS KANN ICH TUN?

- **Ausdruck von Angst** zulassen und halten, aber **Abstand vom angsterregenden Objekt** schaffen (*Wenn Kinder Angst zeigen, haben sie schon innere Ressourcen. Wer Hoffnung hat, kann mit Angst reagieren. Wer resigniert hat, spürt auch keine Angst mehr*)
- **Ressourcenaktivierung** (Kompetenzen aufbauen und erweitern)
- **diskreter „Zeuge“** der traumatischen Erfahrung sein
- **persönliche und intime Grenzen** explizit wahren

WAS KANN ICH TUN?

- durch das **Zulassen angemessener Aggression** entsteht eine neue Bindungsfähigkeit (*Reibung erzeugt Wärme, aggressive Energie in konstruktive Bahnen lenken*)
- **traumaspezifische Vermeidung auflösen**, unter ausgehandelten Bedingungen

WAS KANN ICH TUN?

- **Idealisierung der Eltern** aushalten (*Wenn Kinder kein gutes Vater-/ Mutter-Objekt verinnerlichen konnten, neigen sie dazu, diese Eltern zu idealisieren*)
- **sichere Orte, Wohlfühl-Orte** schaffen
- **Trauma-Trigger** möglichst vermeiden (*Jede Überflutung mit den schlimmen Gefühlen schwächt die innere und äußere Distanzierung vom Trauma und somit auch die Ich-Kräfte*)

WAS KANN ICH TUN?

- traumabezügelte Gespräche **immer auf der Erwachsenen-Ebene** führen, **im Sitzen** oder **Stehen** (*Liegen fördert die maligne Regression. Achtung bei Phantasieeisen!*)
- Immer wieder den **Unrechtscharakter des Erlebten** betonen (*„Was XY mit dir gemacht hat, war nicht richtig und nicht recht“*)

WAS KANN ICH TUN?

➤ schützen,

➤ Sicherheit geben,

➤ verstehen,

➤ begleiten

Herzlichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

Quelle: www.lol.de

... und Tschüss